


Dans les pays en développement, 150 millions d'enfants souffrent de malnutrition

Plus de la moitié des enfants souffrant d'insuffisance pondérale vivent en Asie



La malnutrition est responsable de plus de la moitié des décès d'enfants dans le monde. Les trois quarts des enfants qui meurent suite à des problèmes liés à la malnutrition souffrent seulement de malnutrition modérée, aucun signe extérieur ne révélant leur vulnérabilité. Le pauvreté, des niveaux d'éducation bas et le manque d'accès aux services sanitaires sont les éléments contributifs majeurs à la malnutrition des enfants, une question complexe qui nécessite de s'attaquer aux problèmes sur plusieurs fronts à la fois, tels que :

- ✓ assurer la sécurité alimentaire des familles pauvres;
- ✓ éduquer les familles sur les besoins nutritifs spéciaux des jeunes enfants;
- ✓ protéger les enfants des infections, en les vaccinant contre les maladies infantiles et en leur fournissant un accès à l'eau salubre ainsi qu'à des conditions d'hygiène satisfaisantes.

Les enfants en 2002 : le bilan des changements



Chaque année, plus de 100 millions d'enfants âgés de moins de cinq ans meurent de maladies qui auraient pu être évitées et traitées, telles que la déshydratation causée par la diarrhée, les infections bactériennes et virales, les maladies respiratoires aiguës, la rougeole et la polio. Dans la moitié des cas, la maladie est aggravée par la malnutrition. La Geste intégrée des maladies infantiles a été créée en 1992 par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé avec, pour objectif, la prévention ou la détection précoce et un traitement des principales maladies infantiles mortelles.


Estimation du nombre de cas de polio (en millions)



Les cas de polio ont diminué de 99% de 1988 à 2000

L'assainissement dans le monde en 2000

Pourcentage de la population pourvue d'installations sanitaires satisfaisantes



1,1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau salubre



L'accès à l'eau est un élément crucial en matière de réduction de la mortalité et de la morbidité des enfants de moins de cinq ans, particulièrement dans les zones urbaines pauvres.

- ✓ **Garder l'eau propre.** Environ 4 milliards de cas par an entraînent 2,2 millions de décès, principalement parmi les enfants de moins de cinq ans.
- ✓ **Fréquence.** Cette infection entraîne la diarrhée chez environ 6 millions de personnes. L'aggravation en eau potable a permis de réduire de 25 % le taux d'infection.
- ✓ **Schistosomiasis.** Environ 200 millions de personnes sont infectées. Un approvisionnement en eau potable et de bonnes conditions d'hygiène peuvent réduire de moitié le taux d'infection (77 %).
- ✓ **Choléra.** Ce problème, répandu dans le monde entier, peut être prévenu par l'accès à l'eau potable ainsi que par de bonnes conditions d'hygiène.

Dans plus de 30 pays, concernant 25 % de la population des pays en développement, 10 % des enfants de 5 à 14 ans travaillent. L'Afrique subsaharienne présente les proportions les plus élevées de travailleurs enfants. Deux tiers d'entre eux travaillent dans une ferme ou dans une entreprise familiale. Moins de 5 % :

- ✓ effectuent un travail rémunéré ou non rémunéré en dehors du foyer;
- ✓ s'occupent des travaux domestiques pendant quatre heures ou plus par jour.

La proportion des jeunes travailleurs est sensiblement la même pour les garçons et les filles. Par contre, les différences entre les zones urbaines et les zones rurales sont significatives : 21 % travaillent dans les zones rurales contre 13 % dans les zones urbaines.

19
Les deux tiers des enfants effectuent un travail familial

Pourcentage des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent

